

Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Befristete Fokussierung während des stark erhöhten Infektionsgeschehens, Stand: 10. Februar 2022

					Empfehlung Test-Typ			Kosten-Regelung	Priorisierung (PCR-Test)		
					PCR-Test	Antigentest					
						Schnell-test ¹³	Selbst-test ⁶				
Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung - TestV) verbindlich.											
<p>Grundsätzlich gilt:</p> <p>1) Erweiterte Basishygiene</p> <p>2) Symptom-Monitoring</p> <p>3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abstand halten • Hygieneregeln beachten • im Alltag Maske tragen • Lüften (AHA+L-Regeln) <p>4) Bei positivem Testergebnis Selbstisolation und Information enger Kontakte</p>	<p>Personen mit Risiko für schweren Verlauf</p> <p>Asymptomatische Personen</p>	<p>Testung nach bekannter Exposition</p> <p>Präventive Testungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Praxen und weiteren definierten Settings⁹</p>	<p>Personen mit medizinisch-diagnostischer Indikation (inkl. symptomatische Personen)¹</p>	z.B. Risiko für einen schweren Verlauf (Ältere, Komorbidität, Immunsuppression), Indikation für eine medikamentöse Therapie		2a			VO, K	1	
			<p>Gesundheitspersonal^{1,2}</p>	z.B. Kontakt, Ausbruch		2a,b		4,5		VO	2
			<p>Ausbruch</p>	Indexpersonen, in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. nosokomialer Ausbruch		2a,b		4,5		VO	3
			<p>Patienten, Bewohner, Betreute</p>	bei (Wieder-)Aufnahme sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse		2a,b				VO, K	3
			<p>Reihentests nach Testkonzept der Einrichtung</p>					10		VO	4
			<p>z.B. vor Antritt einer neuen Arbeitsstelle</p>							VO	4
	<p>Personen ohne Risiko für schweren Verlauf</p> <p>Weitere Lebensbereiche</p>	<p>Asymptomatische Personen</p> <p>Präventive Testungen</p>	<p>Bildungseinrichtungen</p>	Basierend auf einrichtungsspezifischen Hygiene- und Testkonzepten (Reihentests)		7			10	L	4
			<p>Betrieblicher Kontext</p>	Basierend auf einrichtungsspezifischen Hygiene- und Testkonzepten (Reihentests)		3			10	AG	5
			<p>Kostenlose Antigentests</p>	breiter, niederschwelliger Zugang und formalem Nachweis über das Testergebnis, z.B. nach Kontakt oder bei positivem Selbsttest		3				VO	5
			<p>Laien-Selbsttests</p>	ergänzend, zur Eigenkontrolle bei Bedarf, ohne formale Testbescheinigung		3				S	5

- Empfohlen
- Möglich
- Möglich bei begrenzter PCR-Kapazität und Dringlichkeit
- Zur Bestätigung von positiven Antigentests oder Pool-PCRs (abrechenbar über TestV)
- Nicht empfohlen oder nicht relevant

- 1) Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza)
- 2a) Im Labor durchgeführte PCR / Point-of-Care Nukleinsäureamplifikationsverfahren (NAT)
- 2b) Point-of-Care NAT
- 3) PCR-Test nur zur Bestätigung eines positiven Antigentests
- 4) Ggf. zur Kohorten-Isolierung
- 5) Z.B. auch labor-basierte Antigen-Tests zur Entlastung von Kapazitäten
- 6) Mit Sonderzulassung durch das BfArM oder CE-Kennzeichnung
- 7) Labor-basierte PCR-Tests für Pool-Testungen möglich
- 8) PCR-Tests zusätzlich für Reihentests in bestimmten Einrichtungen möglich, Veranlassung durch Öffentlichen Gesundheitsdienst erforderlich

- 9) Umfasst auch Einrichtungen für: Menschen mit Behinderungen, Rehabilitation, Ambulante Operationen, Ambulante Pflege, Ambulante Dialyse, Tageskliniken, Eingliederungshilfe, Hospizdienste, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Rettungsdienste und Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3, Satz 1 Nr. 9 IfSG, Obdachlosenunterkünfte; Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern und Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX
- 10) Durch Dritte überwachter Test zur Eigenanwendung
- 11) Auch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung
- 12) Personal in Krankenhäusern, vergleichbare Einrichtungen nach §23 Abs. 3 Nr. 3 IfSG, Arztpraxen, Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Rettungsdienste
- 13) Negativer zertifizierter Antigentest zur vorzeitigen Beendigung von Isolierung & Quarantäne ausreichend.